

## Состав и форма выпуска

Раствор для наружного применения.

1 г раствора содержит: молочная кислота 167 мг и салициловая кислота 167 мг.

*Вспомогательные вещества:* коллоидный вязкий (содержит этанол 96%).

## Фармакологическое действие

Обладает прижигающим действием, коагулирует белки.

## Показания к применению

Лечение обычных и подошвенных бородавок.

## Режим дозирования

Наружно, с помощью кисточки-аппликатора. Препарат наносят на пораженные участки кожи по 1 или несколько капель (достаточное количество для покрытия) 1-2 раза/сут. Препарат оставляют на коже до полного высыхания, после чего при необходимости накладывают пластырь.

Максимальная суточная наносимая доза для взрослых - 10 мл, для детей - 1 мл. Курс лечения - не более 7 дней.

## Побочное действие

Раздражение кожи (гиперемия, жжение), кожные аллергические реакции.

## Противопоказания к применению

- гиперчувствительность;
- пигментный невус;
- волосистые бородавки;
- локализация бородавок в области лица или гениталий;
- детский возраст (до 2 лет).

*С осторожностью* назначают препарат при почечной недостаточности, детям в возрасте от 2 до 12 лет.

## **Применение при беременности и кормлении грудью**

При беременности обрабатываемая поверхность кожи должна быть не более 5 см<sup>2</sup>.

В период лактации следует избегать случайного приема препарат внутрь младенцем путем контакта с обработанными поверхностями.

## **Применение при нарушениях функции почек**

*С осторожностью* назначают препарат при почечной недостаточности.

## **Применение у детей**

Противопоказание — детский возраст (до 2 лет).

*С осторожностью* назначают препарат детям в возрасте от 2 до 12 лет. При лечении детей не следует обрабатывать несколько участков одновременно.

## **Особые указания**

При лечении детей не следует обрабатывать несколько участков одновременно.

Раствор необходимо наносить осторожно, избегая попадания на здоровую кожу.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

2,5 года.

## **Условия реализации**

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.